Linzer biol. Beitr.	37/2	1203-1205	16.12.2005

Hymenopterologische Notizen aus Österreich – 19 (Insecta: Hymenoptera aculeata)

J. GUSENLEITNER

A b s t r a c t : On 8 remarkable species of Eumenidae and Sphecidae collected in Austria are reported.

K e y w o r d s : Eumenidae, Sphecidae, Austria.

Einleitung

In den letzten beiden Jahren konnten wieder einige Interessante Funde an Faltenwespen und Grabwespen in Österreich getätigt werde. Über sie wird anschließend berichtet. Für die Bereitstellung der aufgesammelten Exemplare zur Determination möchte ich mich bei P.A.W. Ebmer (Puchenau), meinem Sohn Mag. Fritz Gusenleitner (Biologiezentrum Linz), Univ. Prof. Dr. Wolfgang Schedl (Innsbruck) und Dr. Martin Schwarz (Kirchschlag N Linz) herzlich bedanken.

Material

E u m e n i d a e

Ancistrocerus dusmetiolus STRAND 1914

M a t e r i a l : Niederösterreich: Neusiedeln N Rohrendorf bei Krems, E15°39'N48°26', 12.5.2005, 2♂♂, leg. A. u. F. Gusenleitner.

In Österreich ist diese Art nur aus dem Osten Niederösterreichs (Bisamberg, Oberweiden und Schlosshof an der March) und aus Wien (Mariabrunn sowie ohne genau Fundortangabe) bekannt.

Symmorphus allobrogus (SAUSSURE 1855)

M a t e r i a l : Niederösterreich: Baumgartleiten NW Herrnbaumgarten, E16°40'30''N48°42'15'', 295m, 18.6.2005, 1♂, leg. J. Gusenleitner.

Dieser Fund im Weinviertel ist deshalb so interessant, weil es sich um eine boreoalpin verbreitete Art handelt.

Sphecidae

Pemphredon beaumonti HELLEN 1955, neu für Österreich

Material: Tirol: SE Puschlin, N Kauns, 47°06'N10°41'E, 1540-1620m, 11.6.2005, 1♂, leg. Dr. Martin Schwarz.

Dies ist der erste Fund in Österreich. Bisher wurde diese Art nach DOLLFUSS (1991) nur in Finnland und der Schweiz gefunden. Nach DOLLFUSS et al. (2001) sind Funde in folgenden Gebieten bekannt geworden: Finnland, Schweden, Deutschland, Karelien, Estland, Norditalien und Frankreich.

Astata kashmirensis NURSE 1909

Material: Niederösterreich: Absdorf NW Tulln, E15°59'N48°24', 182m, 17.6.2005, ♂, leg. J. Gusenleitner.

Es handelt sich bei diesem Fund um den westlichsten in Österreich. Die nächsten Funde sind Stammersdorf in Niederösterreich und Türkenschanze in Wien.

Gorytes planifrons WESMAEL 1852, neu für Österreich

Material: Burgenland: Eisenstadt, Schlosspark, 9.6.2004, 1♀, leg. W. Schedl

Nach DOLLFUSS (1991) und DOLLFUSS et al. (1998) wurde diese Art bisher nicht in Österreich gefunden. DOLLFUSS (1991) gibt als Verbreitung Zentral- und Südeuropa an.

Lestiphorus bicinctus (ROSSI 1794)

Material: Oberösterreich: Böhmdorf NW Reichenthal, 14°21'30"48°33', 670m, 15.7.2005, 1♂, leg. J. Gusenleitner.

Bisher sind nur drei Funde aus dem oberösterreichischen Zentralraum bekannt: Gusen (1981), Luftenberg (1932), Außertreffling NE Linz (1989).

Oxybelus variegatus WESMAEL 1852

Material: Oberösterreich: Steyregg/Pulgarn, Trockenrasen, 260m, E 14°23'14"N48°16'58", 23.6.2004, 1♂, leg. P.A.W. Ebmer; Gstocket N Alkoven, 260m, E14°07'N48°18', 13.8.2005, 1♀, leg. J. Gusenleitner.

Bisher bekannt war nur ein Fund aus Oberösterreich: Kappern SE Marchtrenk, 296m, 48°11'14°08', 19.7.2003.

Cerceris albofasciata (ROSSI 1790)

Material: Niederösterreich: Lassee, Erdpreßhöhe, Sandgrube, 190m, E16°52'10"N48°12'40", 18.8.2004, 1♀, leg. P.A.W. Ebmer.

Nach DOLLFUSS (1991) gab es bisher nur 2 Funde in Oberweiden (Niederösterreich) und ein Fund in Neusiedl am See (Burgenland).

Zusammenfassung

Über 8 Arten von Eumenidae und Sphecidae, welche in Österreich aufgesammelt wurden, wird berichtet.

Literatur

DOLLFUSS H. (1991): Bestimmungsschlüssel der Grabwespen Nord- und Zentraleuropas (Hymenoptera, Sphecidae). — Stapfia **24**: 1-247.

DOLLFUSS H., GUSENLEITNER J. & E. BREGANT (1998): Grabwespen im Burgenland (Hymenoptera, Sphecidae). — Stapfia **55**: 507-552.

DOLLFUSS H., BOUČEK Z. & J. BITSCH (2001): Pemphredonini. — Faune de France. — Hyménoptères Sphecidae d'Europe Occidentale **3**: 55-151.

Anschrift des Verfassers: Dr. Josef GUSENLEITNER
Pfitznerstraße 31
4020 Linz, Austria
E-Mail: j.gusenleitner@utanet.at